

Wells Criteria VTE (معیار ولز جهت ترومبوز آمبولی وریدی)

نمره اکتسابی	نمره	یافته های بالینی برای آمبولی ریوی - PTE	نمره اکتسابی	نمره	یافته های بالینی برای DVT
	+3	وجود علائم بیماری DVT		+1	جراحی و یا صدمه یا گچ در اندام تحتانی - پارزی یا پارالیزی
	+3	تشخیص افتراقی دیگری که علائم بیمار را توجیه کند نداشته باشیم		+1	بستری در تخت بیش از سه روز یا جراحی بزرگ در چهار هفته قبل
	+1/5	ضربان قلب بالای 100		+1	تندرنس در مسیر ورید های پشت زانو یا رانی
	+1/5	بی حرکتی بیش از سه روز یا جراحی در چهار هفته اخیر		+1	تورم یک عضو
	+1/5	سابقه قبلی از TE و DVT		+1	ادم گوده گذار در اندام مبتلا
	+1	وجود خلط خونی		+1	تورم بیشتر از سه cm یک پا نسبت به پای دیگر در 10 سانتی متری زیر زانو
	+1	بدخیمی حاد یا درمان شده در طول شش ماه قبل یا درمان تسکینی		+1	تورم عروقی محیطی که ناشی از واریس نباشد
				+1	داشتن سابقه DVT قبلی
				+1	بدخیمی حاد یا درمان شده که شش ماه قبل بوده است
				+3	تزریق وریدی دارو
				-1	تشخیص جایگزین با احتمال بیشتری نسبت به DVT
	*	2 < نمره احتمال کم 2-6 احتمال متوسط 6 > نمره احتمال بالا		*	1-0 احتمال کم 2-2 1-2 احتمال متوسط 3-3 8-3 احتمال بالا

بیماران با ریسک بالا :

سن بالای 60 - سال - سن بین 40-60 و دارای یک فاکتور خطر دیگر ، سابقه VTE در افراد خانواده یا خود بیمار - چاقی - انعقاد پذیری اکتسابی یا ارثی - بیماریهای زمینه ای مثل بیماری قلبی - عفونت ، سکتته های اخیر بیماریهای التهابی - جراحی سر فمور - آرتروپلاستی زانو - شکستگی لگن - ترومای شدید - صدمات نخاعی یا اعمال جراحی سرطان

بیماران با ریسک پایین :

سن کمتر از 40 سال - مدت زمان بیهوشی کمتر از 30 دقیقه

بیماران با ریسک متوسط :

بیمارانی که تحت عمل جراحی کوچک قرار گرفته است ولی سن بین 40-60 سال دارند و به بیهوشی بیشتر از 30 دقیقه نیاز دارند. قفسه صدی - جراحی اعصاب